Amostragem por distância: transectos lineares

— — — — —
□ □ □

Katia Ferraz

Contexto

- Objetivo:
 - Estimar densidade ou abundância de uma determinada população

Densidade $\Rightarrow D = N/A$

$$\hat{D} = \frac{n}{a}$$

Estimativa de densidade a partir de uma amostra

Métodos

Line transect

Point transect

Strip vs. line transects

- Strip transect (idem para point counts)
 - Assume que todos os indivíduos são observados, independente da distância. Não há medições de distância.
- Line transect
 - Assume que uma estreita faixa ao redor do transecto é amostrada. A observações dos indivíduos a partir do transecto é dependente da distância entre os animais e o observador. Não assume que todos os objetos são identificados.

Observações do método

- Transecto disposto aleatoriamente
- A distância perpendicular do animal em relação à linha do transecto deve ser considerada
- Os indivíduos observados estão a uma certa distância da linha do transecto
- Muitos indivíduos não são observados
- Pode ser percorrido a pé, cavalo, helicóptero, veículo etc.

Importante

- Assume que apenas indivíduos próximos da linha do transecto são observados
- Observações dos indivíduos é dependente da distância entre estes e o observador (linha do transecto)
- Não assume que todos os indivíduos são observados.

Métodos de Distância

- **Premissas:**
 - Animais na linha de contagem serão sempre detectados (probabilidade = 1)
 - A probabilidade de detecção de um objeto diminui de forma inversamente proporcional à distância de observação
 - Animais são registrados na posição inicial da observação e nunca contado duas vezes
 - As distâncias perpendiculares são medidas de modo exato (não há erros de medição)
 - Observações são independentes, não havendo efeito de uma sobre a outra

Princípios

- Contar todos os indivíduos observados ao longo de uma linha ou trilha
- Estimar a distância perpendicular do indivíduo em relação a trilha
- Encontrar um modelo ou **Função de Detecção** que melhor descreva o comportamento das distâncias observadas
- Usar a função para estimar a proporção de animais que não foram detectadas no censo
- Estimar a densidade da população de interesse

Uma população de objetos com um gradiente de densidade é amostrado com linhas paralelas em direção ao gradiente. Neste caso, existem $k = 6$ linhas de comprimento $l_1, l_2, \dots, l_6$, e $\sum l_i = L$.

A área de tamanho A é amostrada por um único transecto de comprimento L . As distâncias de detecção r devem ser estimadas no campo assim como os ângulos de detecção θ , a fim de permitir as análises das distâncias perpendiculares x , calculadas como $x = r \cdot \sin(\theta)$. A distância do objeto em relação ao observador paralelo ao transecto no momento da detecção é $z = r \cdot \cos(\theta)$

(Buckland et al. 1993)

Notação

- a - área amostrada
- K - número de transectos
- l - comprimento da linha
- L - comprimento total percorrido ($\sum l_i$)
- x_i - Distância perpendicular
- r_i - Distância de detecção
- θ_i - Ângulo de detecção
- n - Número de animais detectados
- D - Densidade animal
- w - Truncation distance (distância a partir da qual os animais não são mais detectados)
- μ - Meia largura efetiva da trilha (distância limite da trilha de onde os animais são detectados)

Estimativa de Densidade

Cálculo da área amostrada onde os animais foram detectados

$$a = 2wl$$

Densidade estimada

$$\hat{D} = \frac{n}{2wl\hat{P}_a}$$

$\hat{P}_a$ = probabilidade de um animal escolhido aleatoriamente na área ser detectado

Para a estimativa $\hat{P}_a$, define-se a função de detecção $g(x)$ = probabilidade de um animal à distância x da trilha ser detectado $0 \leq x \leq w$

$g(0) = 1$

Densidade estimada

$$\hat{D} = \frac{n}{a\hat{P}_a} = \frac{n}{2wL\hat{\mu}/w} = \frac{n}{2\hat{\mu}L}$$

Variância

$$\widehat{\text{var}}(\hat{D}) = \hat{D}^2 \left[\frac{\widehat{\text{var}}(n)}{n^2} + \frac{\widehat{\text{var}}[\hat{f}(0)]}{[\hat{f}(0)]^2} \right]$$

Programa Distance

- Programa Distance
 - <http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance/>
- Distance sampling
 - http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance.book/dist_encyc_env.pdf
- Material de referência
 - <http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance.book/>

Recomendações

- Regra 4 x 4: 4 trilhas de 4 km cada (mínimo)
- Distribuir trilhas aleatoriamente à distribuição dos animais
- Não utilizar trilhas utilizadas para outros fins (influência de variáveis externas)
- Padronizar horário e frequência de observação
- Velocidade de 1.000m/h
- Horário: 06h00 às 10h00 e das 14h00 às 18h00
- Esforço amostral: 80 km percorridos por transecto (mínimo)

Recomendações

- Número mínimo de detecções recomendável: 40 por espécie!
- Analisar dados individualmente para cada espécie
- Não agrupar dados em classes de distância (usar dados contínuos)
- Encontrar a Função de Detecção que melhor se ajuste às distâncias perpendiculares observadas para uma determinada espécie
- No programa Distance testar todos os modelos para as funções de detecção

Recomendações

- O melhor modelo é aquele com o menor AIC (*Akaike's Information Criterion*)
- Selecionar o melhor modelo e testá-lo com diferentes filtros
- Observar o modelo com maior valor de GOF (*Goodness of fit*): indica melhor ajuste da função e, conseqüentemente um resultado de densidade mais preciso

Bibliografía

- BOOKHOUT, T.A. (Ed.). 1996. Research and Management Techniques for Wildlife and Habitats. 5ª ed. The Wildlife Society, Bethesda.
- Buckland, S.T., D.R. Anderson, K.P. Burnham, J.L. Laake. 1993. DISTANCE Sampling: Estimating Abundance of Biological Populations. Chapman & Hall, London.
- CAUGHLEY, G. 1977. Analysis of Vertebrate Populations. John Wiley, Chichester.
- KREBS, C.J. 1999. Ecological Methodology. 2ª Ed. Addison Wesley Longman, Menlo Park, California.
- WILLIAMS, B.K., J.D. NICHOLS, M.J. CONROY. 2002. Analysis of Management o Animal Populations. Academic Press, San Diego.